

AMPICILINA CALOX

Antibiótico de amplio espectro

Polvo para reconstituir

FICHA TÉCNICA

Composición: Cada 1 ml del producto reconstituido contiene 200 mg de ampicilina base.

Indicaciones de uso:

AMPICILINA CALOX es un antibiótico de amplio espectro indicado en Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y gatos para el tratamiento de infecciones ocasionadas por *Escherichia coli*, *Salmonella sp*, *Proteus sp*, *Shigella sp*, *Pasteurella sp*, *Staphylococcus sp*, *Streptococcus sp* y *Corynebacterium sp*.

AMPICILINA CALOX, está indicada en abscesos, actinomicosis, carbón asintomático, carbón bacteriano, neumonías, neumoenteritis en terneros, disentería canina, cistitis, nefritis, invasores secundarios de distemper canino, podredumbre de las pezuñas, adenitis equina, leptospirosis, osteomielitis, artritis, onfaloflebitis, infecciones puerperales, septicemia hemorrágica, mastitis.

Mecanismo de acción:

AMPICILINA CALOX es un antibiótico bactericida. Su acción se realiza impidiendo la formación de la pared de la célula bacteriana ya que inhibe la fase final de la síntesis de peptidoglucano.

Después de una aplicación intramuscular, los niveles máximos en plasma se encuentran entre 30 y 60 minutos. La ampicilina difunde rápidamente en todos los líquidos y tejidos del organismo. La ampicilina se excreta en grandes cantidades sin cambios en la orina.

Precauciones y tiempo de retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 15 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y hasta 48 horas después de finalizado no debe darse al consumo humano.

Vía de administración y dosis

Administrar por vía intramuscular o intravenosa.

Dosis. 10 mg / kg de peso vivo. Repetir a las 12 horas. Aplicar entre 3 a 5 días. En la practica 1 ml / 20 kg de peso vivo.

En mastitis: Aplicar con cánula intramamaria.

Diluir el polvo del frasco de 2 gr en 10ml de agua destilada e instilar 5 ml del reconstituido en cada cuarto infectado con cánula mamaria.

Diluir el polvo del frasco de 4 gr en 17 ml de agua destilada e instilar 5 ml del reconstituido en cada cuarto infectado con cánula mamaria.

Presentaciones:

Frasco x 2 gr y 10 mL de agua destilada

Frasco x 4 gr y 20 mL de agua destilada.

Registro ICA: 4067-DB