

ENROFIN 5%

ANTIBACTERIANO DE AMPLIO ESPECTRO

Solución inyectable

FICHA TÉCNICA

Composición:

Cada 1 ml del producto contiene 50 mg de Enrofloxacin.

Indicaciones de uso:

ENROFIN 5 % es un antibacteriano de amplio espectro indicado en Bovinos, porcinos, caninos y gatos para el tratamiento de las enfermedades ocasionadas por: .Streptococcus sp, Escherichia coli, Proteus sp, Clostridium perfringes, Salmonella sp., Pasteurella sp, Bordetella sp, Mycoplasma sp y Staphilococcus sp.

ENROFIN 5%, está indicado en:

Bovinos: Bronquitis, bronconeumonías, neumonías, enterotoxemia, septicemia hemorrágica peste boba, salmonelosis, colibacilosis, vibriosis, pielitis, nefritis, onfalitis, dermatitis, abscesos, heridas de piel.

Porcinos: Bronquitis, bronconeumonías, neumonías, diarrea neonatal de los lechones, salmonelosis, colibacilosis, septicemias, rinitis atrófica, infecciones del aparato genital abscesos, heridas de piel.

Caninos y gatos: Bronquitis, neumonías, nefritis, vaginitis, gastroenteritis, dermatitis, cistitis.

Mecanismo de acción:

ENROFIN 5% es un antibacteriano bactericida. Su acción es sobre el ADN de la bacteria bloqueando la girasa, enzima que interviene en el proceso de replicación bacteriana y metabolismo celular ocasionando la muerte de la bacteria.

ENROFIN 5% no tiene efectos teratógenos ni feto tóxicos. No afecta la fertilidad.

Precauciones y tiempo de retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 7 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y hasta 72 horas después de finalizado no debe darse al consumo humano.

Vía de administración y dosis

Administrar por vía intramuscular, subcutánea



Bovinos: 2.5 mg /Kg de peso vivo. En la práctica 5ml x cada 100 kilos de peso durante 3 a 5 días. No aplicar más de 10 ml por sitio.

Porcinos: 2.5 mg /Kg de peso vivo. En la práctica 5 ml x cada 100 kilos de peso durante 3 a 5 días. No aplicar más de 2.5ml por sitio.

Perros y gatos: 5 mg / kg de peso vivo. En la practica 0,5 ml por cada 5 Kg de peso vivo vía subcutánea.

Presentaciones:

Frasco 10 ml, caja x 12 frascos de 10 ml, frasco x 50 ml y 100 ml.

Registro ICA: 4442 - DB