

ERLICLOX

ANTIBIOTICO DE AMPLIO ESPECTRO

Tabletas con cubierta entérica

FICHA TÉCNICA:

Composición:

Cada Tableta contiene 100 mg de Doxiciclina Base.

Mecanismo de acción:

La Doxiciclina es un derivado de la oxitetraciclina perteneciente al grupo de las tetraciclinas.

Su mecanismo de acción consiste en bloquear la unión del RNA m con el RNA t a nivel de la fracción 30 S ribosomal impidiendo así la replicación bacteriana.

Indicaciones de uso:

ERLICLOX está indicado para el tratamiento de Ehrlichiosis canina y afecciones Bucales y dentarias, estomatitis, gingivitis, periodontitis, piorreas, mal olor bucal.

ERLICLOX actúa en afecciones respiratorias tales como bronquitis, neumonías, infecciones de tracto genitourinario, infecciones del tracto gastrointestinal, sinusitis, infecciones de oído medio, así como enfermedades infecciosas causadas por : *Stafilococcus* sp., *Streptococcus* sp, *Bacillus anthracis*, *Campylobacter* sp., *Clostridium* sp., *Corynebacterium* sp., *Escherichia coli*, *Nocardia*, *Salmonella* sp., *Klepsiella* sp., *Pasteurella* sp., *Bordetella* sp., *Leptospira* sp., *Porphyromona* sp, *Mycoplasmas*, *Rickettsias* (*Ehrlichia* sp.) y *Clamidas*

Contraindicaciones y precauciones:

Los niveles plasmáticos se mantienen de 24 a 36 horas después de haber suspendido la administración. No combinar con antiácidos a base de Calcio, aluminio o magnesio. La coloración en los dientes de cachorros puede ocurrir cuando se administran tetraciclinas a hembras gestantes, en lactación y en las primeras semanas de vida.

Administrar 2 horas antes o 2 horas después de las comidas.

Vía de administración y dosis:

Oral: En Caninos administrar 1 tableta x 20 kilos (5 mg/kpv) cada 12 horas o 1 tableta por cada 10 kilos (10 mg/kpv) cada 24 horas. En Ehrlichiosis el tratamiento debe hacerse por 21 días o según criterio del Médico veterinario



Presentación:

Caja x 2 blíster de 7 tabletas

Caja x 100 tabletas

Caja x 500 tabletas

Registro ICA: 10213 MV