

LORATADINA CALOX

ANTI-HISTAMINICO NO CORTICOIDE

Tabletas

FICHA TÉCNICA

Composición:

Cada Tableta contiene 10 mg de loratadina.

Indicaciones de uso:

LORATADINA CALOX es un Antihistamínico no corticoide, sin acción sedante, de efecto prolongado.

En Caninos y gatos **LORATADINA CALOX** es eficaz para el alivio de los síntomas de la alergia presentes en casos de Rinitis, sinusitis, Urticaria, conjuntivitis y afecciones dermatológicas..

Mecanismo de acción:

LORATADINA CALOX actúa de manera selectiva y específica como antagonista de los receptores periféricos de la Histamina H₁.

Toxicidad:

Loratadina Calox es un medicamento muy seguro. Si se observan efectos colaterales no deseados, consultar al Médico Veterinario.

Vía de administración y dosis:

Oral

Caninos: 0,5 mg por Kg de peso. Perros con peso de 23 kilos y más 1 tableta cada 24 horas.

Gatos ¼ de tableta (2.5 mg) máximo 5 mg (½ tableta) cada 24.

No se recomienda utilizar en animales menores de 3 meses.

La sobredosis marcada puede producir trastornos gastrointestinales.

LORATADINA CALOX es efectiva en el tratamiento de alergias causadas por:

- Pulgas
- Ácaros
- Hongos
- Picaduras de insectos
- Alimentos
- Medicamentos
- Sustancias químicas

Es necesario tener en cuenta que lo más importante en el tratamiento de Alergias es eliminar el agente Causal. **LORATADINA CALOX** es efectivo para eliminar los síntomas de estas alergias y así evitar infecciones secundarias por bacterias, hongos y otros microorganismos y evitar complicaciones tales como automutilaciones causadas por el rascado constante.

Los síntomas más comunes de alergia son:

- Estornudos o Tos
- Dificultad respiratoria
- Lagrimeo
- Secreción nasal
- Enrojecimiento
- Picazón
- Sarpullido
- Inflamación de mucosas
- Engrosamiento de la piel
- Caída del pelo
- Lamido constante de los miembros
- Pelo opaco y quebradizo
- Vomito o diarrea (poco comunes)

Al contrario de la difenhidramina, **LORATADINA CALOX** no produce sedación, no tiene efecto hipnótico, ni produce dificultad motora como tampoco trastornos de la visión (fotofobia, midriasis) Tampoco produce retención urinaria ni estreñimiento.

La Clorfeniramina antihistamínico presente en algunos medicamentos, produce sueño y no puede ser usado en estado de preñez ni en periodo de lactancia. Su vida media es muy corta de 12 a 15 horas.



Presentaciones:

Caja con 10 tabletas x 10 mg

Registro ICA: 9293 – MV.